

نام درس: فیزیک ۱



نام و نام خانوادگی:

تاریخ آزمون: ۱ خرداد ۱۴۰۰

آزمون نوبت اول سال تحصیلی

نام پدر:

مدت آزمون: ۸۵ دقیقه

۹۹-۱۴۰۰

پایه و رشته: دهم تجربی

تعداد سوالات: ۱۲ سوال

دبیرستان فرزانگان دوره دوم

نام دبیر: خانم مقیمه

در ۴ صفحه

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$

۰/۵	چگونه قطر یک سیم بسیار نازک را میتوان با خط کش اندازه گیری کرد. همراه با رسم شکل، توضیح دهید.	۱
-----	---	---

۰/۵	چگونه میتوان با یک آزمایش نشان داد که گازها تراکم پذیرند.	۲
-----	---	---

۰/۷۵	اندازه فشار حاصل از آب گف یک حوض کوچک به صورت زیر گزارش شده است. اندازه این فشار در SI کدام است؟	۳
------	--	---

$$3/5 \times 10^5 \frac{\mu N}{cm^2}$$

با روش زنجیره‌ای پاسخ دهید.


۱/۲۵	مطابق شکل، یک مکعب با ضلعی به طول ۳۰ سانتی‌متر درون ظرف آبی غوطه‌ور و در حال تعادل است. اختلاف نیرویی که از طرف آب به سطح زیرین و بالای آن وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ (چگالی آب ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب بوده و شتاب جاذبه ۱۰ نیوتون بر کیلوگرم فرض شود.)	۴
------	---	---



Add file

## صفحه ی 2

<p>1/5</p> <p>لوله آزمایشی را مطابق شکل، به طور وارون و قائم به اندازه ۲۰ سانتی‌متر درون ظرف جیوه فرو می‌بریم. جیوه فقط به اندازه ۸ سانتی‌متر به درون لوله وارد می‌شود. فشار هوای محبوس در بالای لوله چند سانتی‌متر جیوه است؟</p> <p>(فشار هوای سطح آزاد ظرف ۷۶ سانتی‌متر جیوه است.)</p>	<p>۵</p>
<p>1/5</p> <p>از بالگردی که با تندی ۱۵ متر بر ثانیه در حرکت است، بسته‌ای به جرم ۲۰ کیلوگرم رها می‌شود و بسته با تندی ۲۵ متر بر ثانیه به زمین می‌رسد. اگر بزرگی کار نیروی مقاومت هوای روی این بسته از لحظه رها شدن تا هنگام رسیدن به زمین ۱۶ کیلوژول باشد، این بسته از چه ارتفاعی رها شده است؟</p> <p>(شتاب جاذبه ۱۰ متر بر مجدوثرانیه فرض شود.)</p>	<p>۶</p>
<p>۱/۲۵</p> <p>مطابق شکل، جسمی به جرم <math>1/5</math> کیلوگرم از ارتفاع ۳ متری ( نقطه A ) رها می‌شود و پس از طی مسافت <math>۲/۵</math> متر روی سطح افقی فنری را فشرده می‌کند و جسم برای لحظه‌ای می‌ایستد. چنانچه کار نیروی اصطکاک در مسیر افقی به ازای هر متر برابر <math>۱۶ - \frac{۱}{۵}</math> زول باشد، تغییر انرژی پتانسیل کشسانی سامانه جسم و فنر در این جا به جایی چند زول است؟ (شتاب جاذبه <math>۱</math> نیوتون بر کیلوگرم بوده و سطح منحنی بدون اصطکاک است)</p>	<p>۷</p>



Add file

### صفحه ی 3

<p>1/۵</p> <p>طبق شکل، توبی با تندی اولیه از سطح زمین، به طرف صخره‌ای که ۱۶ متر ارتفاع دارد، پرتاب می‌شود. اگر توب با تندی ۱۲ متربرثانیه به بالای صخره برخورد کند و اندازه نیروی مقاومت هوا روی توب، برابر <math>20 \text{ N}</math> درصد انرژی جنبشی اولیه آن باشد، تندی اولیه توب چند متربرثانیه است؟</p> <p>(شتاب جاذبه <math>10 \text{ m/s}^2</math> متربرثانیه فرض شود.)</p>	<p>۸</p>
<p>1/۵</p> <p>گرمایی که <math>10 \text{ g}</math> بین <math>0^\circ - 40^\circ</math> درجه سانتی گراد را به آب <math>20^\circ</math> درجه سانتی گراد تبدیل می‌کند، دمای <math>300 \text{ g}</math> از فلزی با گرمایی ویژه <math>4339 \text{ J/kg}</math> زول بر کیلوگرم درجه سانتی گراد را چقدر افزایش می‌دهد؟ گرمایی نهان ذوب <math>334000 \text{ J/kg}</math> زول بر کیلوگرم می‌باشد</p> <p>و ظرفیت گرمایی ویژه آب <math>4200 \text{ J/kg}</math> زول بر کیلوگرم درجه سانتی گراد بوده</p> <p>و ظرفیت گرمایی ویژه بین <math>20^\circ - 40^\circ</math> زول بر کیلوگرم - درجه سانتی گراد فرض شود.</p>	<p>۹</p>
<p>۱/۲۵</p> <p>شکل زیر، نمودار دمای یک جسم چامد فلزی به جرم <math>500 \text{ g}</math> را نشان می‌دهد که توسط یک گرمکن با توان <math>200 \text{ W}</math> می‌شود.</p> <p>(الف) گرمایی نهان ذوب این فلز چند <math>\text{KJ/kg}</math> است؟</p> <p>(ب) نقطه ذوب این جسم چند درجه سلسیوس است؟</p>	<p>۱۰</p>

## صفحه ۴

۱/۵	<p>تقریباً چند گرم بخار آب <math>100^{\circ}\text{C}</math> درجه سانتی‌گراد را باید با <math>100</math> گرم بخ صفر درجه سلسیوس در یک ظرف عایق‌بندی شده مخلوط کنیم تا در نهایت مقداری آب <math>50^{\circ}\text{C}</math> درجه سانتی‌گراد حاصل شود؟</p> $(C_{H_2O} = 4200 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}, L_f = 336 \frac{J}{g}, L_v = 2256 \frac{J}{g})$	۱۱
۱/۶	<p>اختلاف طول میله‌های A و B در دمای <math>\theta_1</math> cm است. دمای هر دو میله را به مقدار یکسان افزایش می‌دهیم. اگر اختلاف طول میله‌ها تغییری نکند، طول میله‌ی بلندتر در دمای <math>\theta_1</math> چند سانتی‌متر بوده است؟</p> $(\alpha_A = 6 \times 10^{-6} K^{-1}, \alpha_B = 18 \times 10^{-6} K^{-1})$	۱۲
۱۴/۵	پارم این قسمت از آزمون :	