

محل مهر آموزشگاه	نوبت دوم خرداد ۱۴۰۰	بسمه تعالی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت دبیرستان غیر دولتی اندیشه های شریف (دوره دوم) مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:
	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۳/۸		پایه تحصیلی: دهم کلاس: نرگس
	نمره پس از تجدید نظر:		سوالات درس: شیمی ۱

نام و نام خانوادگی دبیر و امضا: نموده با عدد: نمره با حروف:

بارم	سوالات	ردیف.												
۲/۲۵	<p>اگر اختلاف تعداد الکترون ها و نوترون ها در یون $^{79}M^{2-}$ برابر ۹ باشد</p> <p>آ) عدد اتمی M را تعیین کنید.</p> <p>ب) تعداد نوترون های M را حساب کنید.</p> <p>پ) آرایش الکترونی M را رسم کنید.</p> <p>ت) M در کدام دوره و گروه قرار دارد؟</p> <p>ث) این اتم چند الکترون با $1 = 1$ (عدد کوانتمی فرعی ۱) دارد؟</p>	۱												
۱/۵	ا تم فرضی X دارای سه ایزوتوپ با جرم های ۳۰ ، ۳۲ و ۳۴ است. اگر جرم اتمی میانگین آن $32/2$ amu و فراوانی ایزوتوپ سنگین تر ، دو برابر فراوانی ایزوتوپ سبک تر باشد، فراوانی هر ایزوتوپ چقدر است؟	۲												
۲/۲۵	<p>جدول زیر را کامل کنید.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>تعداد جفت الکترون ناپیوندی</th> <th>ساختار لوویس</th> <th>فرمول شیمیایی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>CO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>HCN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C_2H_2</td> </tr> </tbody> </table>	تعداد جفت الکترون ناپیوندی	ساختار لوویس	فرمول شیمیایی			CO			HCN			C_2H_2	۳
تعداد جفت الکترون ناپیوندی	ساختار لوویس	فرمول شیمیایی												
		CO												
		HCN												
		C_2H_2												
۱/۵	انحلال پذیری مس (II) سولفات در دماهای ۸۵ و $15^{\circ}C$ به ترتیب ۶۰ و ۱۸ گرم است . اگر ۱۲۰ گرم محلول سیر شده این ماده را از دمای ۸۵ درجه به ۱۵ درجه سلسیوس سرد کنیم ، چند گرم رسوب در ظرف تشکیل می شود؟	۴												

ردیف	متن سوال	بارم
۵	<p>فلز M تشکیل یک ترکیب یونی به فرمول $M_2(SO_4)_3$ می دهد.</p> <p>آ) فرمول نیتریت و کلرید فلز M را بنویسید.</p> <p>ب) M کدام یک از فلزات می تواند باشد (K_{19} یا Sc_{21}) ؟ چرا؟</p>	۱/۵
۶	<p>واکنش های شیمیایی زیر را موازن کنید.</p> <p>a) $NH_3 + O_2 \rightarrow NO + H_2O$</p> <p>b) $Pb(NO_3)_3 + Na_3PO_4 \rightarrow Pb_3(PO_4)_2 + NaNO_3$</p>	۲
۷	<p>از واکنش سوختن کامل ۹۰ گرم گاز C_2H_6 مطابق واکنش زیر ، چند گرم CO_2 تولید می شود؟</p> <p>($M_C = 12$, $M_O = 16$, $M_H = 1 g.mol^{-1}$)</p> $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$	۱/۵
۸	<p>با توجه به نمودار زیر در هر مورد عبارت درست را انتخاب کنید.</p> <p>آ) در دمای $80^{\circ}C$ نقطه (B / A) برای نمک (۱) نمایانگر یک محلول فراسیر شده و برای نمک (۲) نشان دهنده یک محلول (سیر شده / سیر نشده) می باشد.</p> <p>ب) در دمای (صفر / $40^{\circ}C$) درجه سلسیوس ، انحلال پذیری دو نمک با یکدیگر برابر است.</p> <p>پ) در کل با افزایش دما ، انحلال پذیری دو نمک (زیاد / کم) می شود.</p> <p>ت) در نقطه C محلول نسبت به نمک (۲) (سیر شده / سیر نشده) است و (می تواند / نمی تواند) مقدار بیشتری از این نمک را در خود حل کند.</p>	۱/۵
۹	<p>به پرسش های زیر پاسخ دهید.</p> <p>آ) چرا اتانول می تواند به هر نسبت در آب حل شود؟</p> <p>ب) انحلال پذیری گازها با فشار و دما چه رابطه ای دارد؟</p>	۲

ردیف	متن سوال	بارم
۱۰	در ۴۰۰ میلی لیتر محلول پتاسیم کلرید، ۱۴۹ گرم KCl حل شده است. غلظت مولار این محلول چقدر است؟ (K = 39 , Cl = 35.5 : g.mol ^{-۱})	۱
۱۱	درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را مشخص کرده و شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. آ) N ₂ O ₅ یک ترکیب مولکولی است که نام آن دی نیتروژن تری اکسید می باشد. ب) آلومینیوم در طبیعت به شکل بوکسیت وجود دارد که در آن آلومینیوم اکسید به همراه ناخالصی یافت می شود. پ) فلاتی مانند طلا و پلاتین به شکل ترکیب در طبیعت یافت می شوند. ت) هر چه نیروی بین مولکولی در یک ماده بیشتر باشد ، تغییر حالت آن از مایع به گاز آسانتر است.	۲
۱۲	با افزودن مقداری سدیم به آب ، ۱۴۰ mL گاز هیدروژن در شرایط استاندارد و ۲۵۰ mL محلول سود تولید شده است. غلظت مولی محلول چقدر است? $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$	۱

با آرزوی موفقیت و کامیابی