

# استادلینک سایت جستجوی معلم خصوصی

رشه: علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۶ عصر	پایه: یازدهم دوره دوم متوسطه	سوالات امتحان هماهنگ درس: ریاضی ۲
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحات: ۲	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸	نام و نام خانوادگی:
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پژوهش			دانش آموزان روزانه سراسر کشور در نوبت خردآدماه سال ۱۴۰۲

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد.)	بارم
-۱	<p>گزینه‌ی مناسب را تعیین کنید.</p> <p>الف) فاصله نقطه <math>A(-2, 2)</math> از خط <math>3x+4y-6=0</math> کدام است؟</p> <p><math>\frac{6}{5}</math> (D)      <math>\frac{8}{5}</math> (C)      <math>\frac{4}{5}</math> (B)      <math>\frac{-4}{5}</math> (A)</p> <p>ب) در هر مثلث هر پاره خطی که وسط دو ضلع را به هم وصل می کند..... ضلع سوم است.</p> <p>(A) موازی (B) مساوی (C) موازی و مساوی نصف (D) موازی و مساوی</p> <p>پ) اگر نسبت مساحت‌های دو مثلث متشابه برابر <math>\frac{4}{25}</math> باشد نسبت نیمساز‌های آن‌ها برابر..... است.</p> <p><math>\frac{4}{50}</math> (D)      <math>\frac{4}{5}</math> (C)      <math>\frac{2}{5}</math> (B)      <math>\frac{16}{625}</math> (A)</p> <p>ت) برد تابع <math>f(x) = [x]</math> کدام است؟</p> <p>(A) اعداد حقیقی (B) اعداد گویا (C) اعداد طبیعی (D) اعداد صحیح</p> <p>ث) اگر <math>A</math> و <math>B</math> دو پیشامد مستقل باشند آنگاه کدام گزینه صحیح است؟</p> <p><math>P(A \cap B) = P(S) \quad (B)</math>      <math>P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \quad (A)</math>  <math>A \cap B = A \times B \quad (D)</math>      <math>A \cap B = \emptyset \quad (C)</math></p>	
-۲	<p>الف) اگر <math>(2, 4)</math> و <math>(-2, 4)</math> دو سر قطر یک دایره باشند، مختصات مرکز دایره را بیابید.</p> <p>ب) معادله روبرو را حل کنید.</p> $\sqrt{2-x} = x$	۱/۷۵
-۳	<p>الف) حکم کلی زیر را با مثال نقض رد کنید.</p> <p>به ازای هر عدد طبیعی <math>n</math>، مقدار عبارت <math>n^2 + n + 41</math> عددی اول است.</p> <p>ب) در مثلث قائم الزاویه <math>ABC</math> به رأس قائمه <math>A</math>، اگر <math>AH = 4\text{cm}</math> ارتفاع وارد بر <math>BC</math> باشد و <math>AH = 4\text{cm}</math> آنگاه اندازه <math>HC</math> و <math>BH = 2\text{cm}</math> را بدست آورید.</p>	۲
-۴	اگر $f(x) = 3x + 5$ باشد مقدار $f^{-1}(8)$ را تعیین کنید.	۰/۵
-۵	اگر $g(x) = x^2 - 4$ و $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ باشد ضابطه و دامنه‌ی تابع $\frac{f}{g}$ را تعیین کنید.	۱/۷۵
-۶	نمودار تابع $y = -\sin x + 1$ را در فاصله‌ی $[0, 2\pi]$ و رسم کنید و مقدار ماکسیمم و می نیمم نمودار را تعیین کنید.	۱/۵
-۷	حاصل عبارت مقابله را بیابید:	۱/۵

رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۶ عصر	پایه: یازدهم دوره دوم متوسطه	سوالات امتحان هماهنگ درس: ریاضی ۲
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحات: ۲	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸	نام و نام خانوادگی:
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش			دانش آموزان روزانه سراسر کشور در نوبت خردآدماه سال ۱۴۰۲
<a href="http://aee.medu.gov.ir">http://aee.medu.gov.ir</a>			

۱	نمودار تابع $y = -\log_{\frac{1}{2}} x$ را رسم کنید.	-۸
۲	معادلات نمایی و لگاریتمی زیر را حل کنید.  (الف) $3^{x-2} = \frac{1}{27^x}$ (ب) $\log(x+3) + \log x = 1$	-۹
۰/۵	اگر $\log_{\frac{1}{2}} 2 \approx -0.3010$ و $\log_{\frac{1}{3}} 2 \approx -0.48$ آنگاه حاصل $\log_{\frac{1}{2}} 3 \approx 0.48$ را بیابید.	-۱۰
۱	با توجه به نمودار حاصل را بیابید.  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) - 3 \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + 3 f(-1) =$	-۱۱
۱	مقدار حد های زیر را در صورت وجود تعیین کنید.  (الف) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 9}$ (ب) $\lim_{x \rightarrow 1402^-} [x]$ (ج) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos x$	-۱۲
۱/۵	مقادیر $a$ و $b$ را چنان تعیین کنید که تابع زیر در نقطه $x = -1$ پیوسته باشد.  $f(x) = \begin{cases} -1 & x < -1 \\ ax+b & x = -1 \\ x^2 - b & x > -1 \end{cases}$	-۱۳
۱/۲۵	فرض کنید در یک سال احتمال قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در آسیا برابر $5/0$ و احتمال قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در آسیا برابر $6/0$ باشد. با چه احتمالی حداقل یکی از دو تیم قهرمان خواهد شد؟	-۱۴
۱/۵	ضریب تغییرات داده های مقابله را تعیین کنید.	-۱۵
۲۰	جمع بارم موفق باشید.	

ساعت شروع: ۱۶ عصر	رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان هماهنگ درس: ریاضی ۲
تعداد صفحات: ۳	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸	پایه: یازدهم دوره دوم متوسطه
مرکزآرزوی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پژوهش		دانش آموزان روزانه سراسر کشور در نوبت خودادماه سال ۱۴۰۲
<a href="http://aee.medu.gov.ir">http://aee.medu.gov.ir</a>		
بارم	راهنمای تصحیح	ردیف

۱/۲۵	(۰.۲۵) هر مورد	A(۳) D(۱) B(۷) C(۱)	الف) ۱
۱/۷۵	$\text{مرکز دایره } O \quad \left  \begin{array}{l} x_0 = \frac{۲+۴}{۲} = ۳ \\ y_0 = \frac{۴+(-۲)}{۲} = ۱ \end{array} \right.$ <p style="text-align: right;">الف) (۰.۷۵)</p> $۲ - x = x^۱ \rightarrow x^۱ + x - ۲ = \cdot \rightarrow (x + ۲)(x - ۱) = \cdot$ $\rightarrow \begin{cases} x = -۲ & \text{غایق} \\ x = ۱ & \text{غایق} \end{cases}$ <p style="text-align: right;">ب) (۱)</p>		۲
۲	<p>الف) کافیست <math>n=4</math> یا مضرب ۴۱ انتخاب شود.      ب) هر مورد (۰.۷۵)</p> $AH^۱ = BH \cdot HC \rightarrow ۴^۱ = ۲ \times HC \rightarrow HC = ۸$ $AB^۱ = ۲^۱ + ۴^۱ = ۲۰ \rightarrow AB = \sqrt{۲۰} = ۲\sqrt{۵}$	(۰.۵)	۳
۰/۵	$۲x + ۵ = ۸ \rightarrow x = ۱ \rightarrow (۱, ۸) \in f \rightarrow f^{-1}(۸) = ۱$		۴
۱/۷۵	$\text{الف) } \frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{x+۴}{۲}}{\frac{x-۱}{۲}} = \frac{x+۴}{(x-۱)(x-۴)} = \frac{۱}{(x-۱)(x-۴)}$ <p style="text-align: center;">۰/۲۵                                   ۰/۲۵</p> $D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g - \{x   g(x) = \cdot\} = (R - \{۱\}) \cap R - \{۲, -۲\} = R - \{۱, ۲, -۲\}$ <p style="text-align: center;">۰/۲۵                                   ۰/۷۵                                   ۰/۲۵</p>		۵
۱/۵	(۰.۲۵) مقدار می نیمم = ۰      (۰.۲۵) مقدار ماکسیمم = ۲	رسم نمودار دقیق ۱ نمره	۶
۱/۵	(۰.۵)	$A = \sin(۹۰^\circ + ۳۰^\circ) - \cos(۱۸۰^\circ - ۳۰^\circ) = \cos ۳۰^\circ - (-\cos ۳۰^\circ) = \frac{\sqrt{۳}}{۲} + \frac{\sqrt{۳}}{۲} = \sqrt{۳}$	۷

ساعت شروع: ۱۶ عصر	رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان هماهنگ درس: ریاضی ۲
تعداد صفحات: ۳	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸	پایه: یازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز آزاده کشور در نوبت خودادماه سال ۱۴۰۲		دانش آموزان روزانه سراسر
دانش آموزان روزانه سراسر کشور در نوبت خودادماه سال ۱۴۰۲		
بارم	راهنمای تصحیح	ردیف

۱	<p>رسم دقیق نمودار ۱ نمره انتقال ۳ واحد به راست تابع <math>y = \log_2 x</math> و سپس قرینه نسبت به محور Xها</p>	۸
۲	<p>(الف)</p> $3^{x-2} = \frac{1}{(3^x)^2} = 3^{-2x} \rightarrow x - 2 = -2x \rightarrow x = \frac{1}{3}$ <span style="float: right;">(۰.۵)</span> <p>(ب)</p> $\log(x+3)x = 1 \rightarrow (x^2 + 3x) = 1 \cdot \rightarrow x^2 + 3x - 1 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -5 \\ x = 2 \end{cases}$ <span style="float: right;">(۰.۵)</span> <p>(۰.۲۵) (۰.۲۵) (۰.۵)</p>	۹
۰/۵	$\log 2^2 \times 3 = 2 \log 2 + \log 3 = 2 \times 0.3 + 0.48 = 1.08$	۱۰
۱	$0.25$ هر مورد $3 - 3(-1) + 3(1) = 9$	۱۱
۱	<p>الف</p> $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{3}{3+3} = \frac{1}{2}$ <span style="float: right;">(۰.۵)</span> <p>۱۴۰۱ (ب)</p> <p>(۰.۲۵)</p> <p>(ج) <math>\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}</math> (۰.۲۵)</p>	۱۲
۱/۵	<p>شرط پیوستگی</p> <p>مقدار تابع=حد چپ=حد راست</p> $f(-1) = a(-1) + b = -a + b$ <span style="float: right;">(۰.۲۵)</span> $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (-1) = -1$ <span style="float: right;">(۰.۲۵)</span> $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} x^2 - b = (-1)^2 - b = 1 - b$ <span style="float: right;">(۰.۲۵)</span> $\begin{cases} 1 - b = -1 \rightarrow b = 2 \\ -a + b = -1 \rightarrow -a + 2 = -1 \rightarrow a = 3 \end{cases}$ <span style="float: right;">(۰.۲۵) (۰.۵)</span>	۱۳
۱/۲۵	<p><math>P(A) = 0.5</math> پیشامد قهرمانی تیم ملی فوتبال A</p> <p><math>P(B) = 0.6</math> پیشامد قهرمانی تیم ملی والیبال</p> <p><math>P(A \cap B) = 0.5 \times 0.6 = 0.3</math> مستقل (۰.۵)</p> <p><math>P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.5 + 0.6 - 0.3 = 0.8</math> (۰.۷۵)</p>	۱۴

ساعت شروع: ۱۶ عصر	رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان هماهنگ درس: ریاضی ۲
تعداد صفحات: ۳	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸	پایه: یازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز آموزشی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.gov.ir">http://aee.medu.gov.ir</a>		دانش آموزان روزانه سراسر کشور در نوبت <b>خردادماه</b> سال ۱۴۰۲
بارم	راهنمای تصحیح	ردیف

۱/۵	$\bar{X} = \frac{۱+۳+۵+۷}{۴} = \frac{۱۶}{۴} = ۴$ $\text{میانگین}$ $\delta^2 = \frac{(۱-۴)^2 + (۳-۴)^2 + (۵-۴)^2 + (۷-۴)^2}{۴} = \frac{۲۰}{۴} = ۵$ $\text{واریانس}$ $\text{انحراف معیار} = \sqrt{\delta^2} = \sqrt{۵}$ $C.V = \frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{\sqrt{۵}}{۴}$ $\text{ضریب تغییرات} = \frac{\sqrt{۵}}{۴}$	(۰.۲۵)	(۰.۵)	(۰.۲۵)	(۰.۵)	۱۵
۲۰	همکاران مصحح: لطفا به راه حل های صحیح به تناسب بارم، نمره تعلق گیرد. در نهایت، نظر همکاران محترم صائب است.					